

ОПАСНЫЕ СОСТОЯНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ


ГИПЕРГЛИКЕМИЯ

(кетацидоз)

Повышение уровня глюкозы и кетонов в крови

Основная причина: острая нехватка инсулина

СИМПТОМЫ



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

1. Вызвать скорую помощь
2. Определить уровень глюкозы в крови (при возможности)
3. Успокоить ребёнка
4. Дать чистую питьевую воду
5. При отсутствии сознания – уложить на бок



ГИПОГЛИКЕМИЯ

Резкое падение уровня глюкозы в крови

Основная причина: избыток инсулина

СИМПТОМЫ



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

1. Определить уровень глюкозы в крови (при возможности)
2. Дать ребёнку быстрые углеводы (шоколад, печенье, очень сладкий чай и т.д.)
3. Через 15 минут проконтролировать уровень глюкозы
4. При отсутствии сознания – вызвать скорую помощь
5. Тяжелая гипогликемия требует безотлагательного вызова скорой помощи!

ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ: ПРИ ОТСУТСТВИИ СВОЕВРЕМЕННОЙ И АДЕКВАТНОЙ ПОМОЩИ РАЗВИВАЕТСЯ КОМА