ПЛАНОВАЯ ПРОФИЛАКТИКА

ветряной оспы проводится лицам из групп высокого риска (тяжелые хронические заболевания, острый лейкоз, лица, получающие иммунодепрессанты, лучевую терапию, пациенты, которым планируется провести трансплантацию органа):

-детям, в возрасте от 1 года до 13 лет - однократно;

-детям старше 13 лет и взрослым двукратно с интервалами между введениями 6-10 недель.

ПРОФИЛАКТИКЕ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ подлежат дети и взрослые, находившиеся в тесном контакте с больными (члены семей, медицинский персонал), а также лица, подлежащие призыву на военную службу, ранее не привитые и не болевшие ветряной оспой.
Проводится одной дозой вакцины в течение первых 96 часов после контакта с больным (предпочтительно в течение первых 72 часов).

Прививка не рекомендуется беременным и кормящим женщинам.
Следует принимать адекватные меры контрацепции в течение 1 месяца после введения вакцины.

Иммунизация лиц из групп высокого риска против ветряной оспы позволяет снизить риск развития осложнений, вызываемых ветряной оспой.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
учись быть здоровым
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ветряная оспа
что нужно знать

Самое актуальное здесь!

#Ты сильнее
Минздрав рекомендует

8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU

ВЕТРЯНАЯ ОСПА (ветрянка)

острое вирусное заболевание, сопровождающееся лихорадкой и сыпью на коже.

Отличается чрезвычайно высокой заразностью. Болеют взрослые и дети.

ВОЗБУДИТЕЛЬ — вирус герпеса третьего типа (вирус варицелла-зостер).
После перенесённой инфекции возбудитель навсегда остаётся в организме, обеспечивая пожизненный иммунитет.

ОПАСНА возможными тяжелыми осложнениями у ослабленных детей и у взрослых.
Инфекция опасна для беременной женщины и плода: может вызвать преждевременные роды, мертворождение, задержку умственного и физического развития ребенка.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ — человек, больной ветрянкой или опоясывающим лишаём.

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ:
- **воздушно-капельный** (с вдыхаемым воздухом, содержащим частицы слюны инфицированного),
- реже — **при прямом контакте с высыпаниями.**

Больные становятся заразными за 48 часов до появления сыпи и до 5-го дня с момента появления последнего элемента.

ИНКУБАЦИОННЫЙ (бессимптомный) период: от 10 до 21 дня (чаще 14-17 дней)

ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

Повышение температуры тела

Головная боль

Усталость

Снижение аппетита

Зудящая сыпь с образованием пузырьков с прозрачным содержимым на коже, в том числе на волосистой части головы, на слизистой оболочке рта и глаз

Высыпания появляются волнообразно и сопровождаются повышением температуры тела

Отличительной особенностью ветряной оспы у взрослых являются выраженные симптомы интоксикации и частое развития тяжелых осложнений, вплоть до летального исхода

ОСЛОЖНЕНИЯ:

- гнойничковые поражения кожи,
- конъюнктивит,
- стоматит,
- пневмония,
- менингит,
- энцефалит,
- миокардит,
-атаксия (нарушение координации движений).

ЛЕЧЕНИЕ зависит от тяжести.
В большинстве случаев ограничивается медикаментозной терапией, направленной на уменьшение зуда и нормализацию температуры тела, и местным лечением.