

## ПРОФИЛАКТИКА

**Вакцина против гепатита В является самым эффективным способом профилактики этого заболевания.**


Детям первую прививку в рамках национального календаря профилактических прививок делают в течение 24 часов после рождения, вторую - по достижении месячного возраста, а третью - не раньше, чем через 5 месяцев (на 6 месяце жизни).

Такая же схема (1-2-6 месяцев) используется для вакцинации детей старшего возраста и взрослых.



Детей из группы риска (мать болеет любой клинической формой вирусного гепатита В, мать не обследована во время беременности, в семье есть больной гепатитом, ребенок из неблагополучной семьи) прививают по схеме: 0-1-2-12 месяцев.

Непривитым в случае, если произошел контакт с вирусом (с кровью, половой, бытовой) в первые трое суток проводится экстренная профилактика.



### Другие способы профилактики гепатита В:


- Использование презерватива при каждом половом контакте, если неизвестно состояние здоровья полового партнера.
- Отказ от использования инъекционных наркотиков.
- Проведение косметических, маникюрных, педикюрных и других процедур, нанесение татуировок, пирсинга только в надежных салонах.
- Отказ от использования чужих зубных щеток, бритв, расчесок, даже если они принадлежат члену семьи.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



# Гепатит В

## ФАКТЫ, КОТОРЫЕ НАДО ЗНАТЬ КАЖДОМУ



Самое актуальное здесь!



8 800 200 0 200  
TAKZDOROVU.RU

## ГЕПАТИТ В

**тяжелое инфекционное заболевание, вызванное вирусом гепатита В.**

Может протекать в легкой или тяжелой форме, в острой (длится менее шести месяцев) или хронической (длится шесть и более месяцев). Риск хронизации максимален при заражении детей в возрасте до 5 лет.

### ЧЕМ ОПАСЕН:

✓ Хроническая инфекция может оставаться незамеченной в течение десятилетий, пока не проявит себя циррозом или раком печени. Все это время человек является заразным и способен передавать вирус другим людям через свои биологические жидкости.

✓ Приводит к снижению физического и эмоционального качества жизни, инвалидизации и преждевременной смерти.

✓ Инфекция может стать пусковым фактором заболеваний почек, сосудов, легких, сердца, суставов и др.

### ИСТОЧНИКИ ЗАРАЖЕНИЯ:

Больной любой формой заболевания.

Вирус передается от человека к человеку через кровь, сперму, вагинальные выделения, слюну.

Отличается необычайной устойчивостью во внешней среде и высокой заразностью.

Для инфицирования достаточно 0,0005 мл крови. Заразиться можно в любом возрасте.



### ЗАРАЖЕНИЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ

- ✓ через иглы и шприцы, загрязненные зараженной кровью
- ✓ при немедицинских манипуляциях, сопровождающихся повреждением кожи или слизистых оболочек (татуировки, пирсинг, косметические, маникюрные, педикюрные и другие процедуры)
- ✓ при попадании крови на микроскопические раны кожи и слизистых оболочек (при использовании чужих зубных щеток, расчесок, мочалок и прочих гигиенических предметов)
- ✓ при незащищенном половом контакте (особенно анальном) через кровь, сперму или вагинальные выделения
- ✓ от матери ребенку во время беременности и родов

### ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД:

Длительность скрытого периода составляет от 1- 4 до 6 месяцев, в среднем - 80 дней.

### ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

выраженная слабость, повышение температуры тела, боли в суставах, снижение аппетита, тошнота, рвота, запор или диарея, тупые боли и чувство тяжести в правом подреберье, кожные высыпания, носовые кровотечения, пожелтение кожи и/или белков глаз (может протекать без желтухи), головокружение и головная боль, кожный зуд. Болезнь может протекать без симптомов.

### ЛЕЧЕНИЕ:

Лечение зависит от формы, тяжести заболевания и возраста пациента.

При подозрении на заболевание острым гепатитом В с целью оказания своевременной медицинской помощи и предотвращения развития осложнений рекомендуется госпитализация в инфекционное отделение.

