ОСЛОЖНЕНИЯ:

- артриты (чаще у взрослых): припухлость и болезненность мелких суставов кистей рук, реже - коленных и локтевых;
- краснушный энцефалит: головная боль, ухудшение общего самочувствия, слабость мышц одной половины тела, судороги, кома. Летальность 15-20% и более.

Реже:

- невриты (воспаление нервов);
- пневмония;
- синусит;
- отит;
- нефрит (поражение почек);
- поражения поджелудочной железы с развитием сахарного диабета 1-го типа;
- кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки, носовые, кишечные кровотечения.

У 30-50% инфицированных краснуха протекает в бессимптомной форме.

Заражение краснухой беременной в первом триместре часто приводит к гибели плода или серьёзным дефектам его развития (в 60% случаев) — слепоте, глухоте, умственной отсталости, порокам сердца. Примерно треть всех беременностей заканчивается выкидышем.

ЛЕЧЕНИЕ зависит от тяжести заболевания. Какой-либо специальный вид лечения краснухи отсутствует.

ПРОФИЛАКТИКА:

Самым надежным способом профилактики краснухи у детей является активная иммунизация по схеме:

- вакцинация однократная - в 12 месяцев;
- ревакцинация - в 6 лет.

Пациентам старше 18 лет достаточно 1 дозы.

Непривитым детям в случае контакта проводится эстренная профилактика иммуноглобулином.

Женщинам, планирующим беременность, следует убедиться в наличии иммунитета к краснухе.

Прививка дает возможность больше не опасаться заболеть краснухой и заразить будущих мам.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
учись быть здоровым
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Краснуха

ЧЕМ ТАК ОПАСЕН ВИРУС?

Самое актуальное здесь!

#Ты сильнее
Минздравмед утверждает!

8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU

КРАСНУХА
острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом.

Краснушной инфекцией болеют непривитые лица любого возраста и пола.

ОПАСНОСТЬ ОБУСЛОВЛЕНА:
- тяжелым течением болезни у взрослых;
- возможными осложнениями;
- тяжелыми последствиями для плода в случае заражении беременной;
- наличием бессимптомных форм.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ: больной человек, в том числе с атипичной и бессиптомной формами краснухи.

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ:
- воздушно-капельный (при чихании, кашле, разговоре);
- вертикальный (внутриутробное заражение плода через плаценту).

ИНКУБАЦИОННЫЙ (БЕССИМПТОМНЫЙ) ПЕРИОД:
от 11 до 24 дней.

ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

интоксикация:
недомогание, небольшая слабость, умеренная головная боль, иногда боль в мышцах и суставах, повышение температуры тела

поражение дыхательных путей:
насморк, сухой кашель (в основном у детей старшего возраста)

лимфоаденопатия:
увеличение и болезненность затылочных и заднешейных лимфатических узлов, возможно увеличение всех групп лимфатических узлов

сыпь:
на лице, за ушами, на волосистой части головы, на спине, пояснице, ягодицах, разгибательнных поверхностях конечностей (у 25-30% больных может отсутствовать)

конъюнктивит:
светобоязнь, покраснение глаз

увеличение селезёнки и печени